



Laboratorios ZOTAL S.L.
Ctra. Nacional 630, Km. 809.
Apdo. de Correos, 4. 41900 Camas (Sevilla) España
Tel.: +34 954 390 204 · Fax: +34 954 395 516
E-mail: zotal@zotal.com



www.zotal.com

FICHA TÉCNICA

1. NOMBRE COMERCIAL.

ZYNRAT DN PASTA FRESCA

2. FORMA DE PRESENTACIÓN.

Cebo contra ratas y ratones en general.

3. COMPOSICIÓN.

Difenacoum puro 0.0029 % (=0.029 g/kg)

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Formulación: sólido.

Olor: característico.

Densidad (20° C): 1.882 g/cc

5. PERIODO DE VALIDEZ.

24 meses desde la fecha de fabricación

6. INDICACIONES, DOSIS RECOMENDADAS Y MODO DE EMPLEO.

ZYNRAT DN PASTA FRESCA es un cebo en pasta rodenticida listo para su uso. Para el control de infestaciones de rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*) y ratón común (*Mus musculus*), en todas las etapas de desarrollo. Contiene difenacoum, principio activo anticoagulante de segunda generación. Gracias a su modo de acción, la muerte de los roedores ocurre sin despertar sospechas hacia el cebo por parte de los otros miembros de la colonia. ZYNRAT DN PASTA FRESCA tiene una formulación única y patentada de PASTA PLUS (patente N°: EP 1 279 334 B1) que combina componentes de origen alimentario como la harina de leche, azúcar y grasas enriquecidas con cereales, para maximizar su palatabilidad frente a las especies de roedores, indicadas anteriormente.

El cebo en pasta es extremadamente versátil, ya que es muy apetecible, y su uso está indicado en áreas del entorno de los animales o en las actividades estrechamente relacionadas con su explotación.

Categoría de usuario: solo para personal profesional (aquel que desempeña su actividad profesional en el entorno de los animales o en las actividades estrechamente relacionadas con su explotación).



Laboratorios ZOTAL S.L.
Ctra. Nacional 630, Km. 809.
Apdo. de Correos, 4. 41900 Camas (Sevilla) España
Tel.: +34 954 390 204 · Fax: +34 954 395 516
E-mail: zotal@zotal.com



www.zotal.com

Método de aplicación: en portacebos resistentes a la manipulación. El cebo se presenta en bolsitas de 10 g.

Dosis y frecuencia de aplicación:

- ⇒ Para el control de ratón común (*Mus musculus*) – interior:
- Alta infestación: hasta 50 g de cebo por punto de cebo, cada 2 m.
 - Baja infestación: hasta 50 g de cebo por punto de cebo, cada 5 m.

Los portacebos deben revisarse al menos cada 2 – 3 días al comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos. Recargar el portacebos cuando sea necesario.

- ⇒ Para el control de rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*) – interior y alrededor de edificaciones:
- Alta infestación: hasta 100 g de cebo por punto de cebo, cada 5 m.
 - Baja infestación: hasta 100 g de cebo por punto de cebo, cada 10 m.

Los portacebos deben revisarse a los 5 – 7 días después del comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo, que los portacebos están intactos y para retirar los roedores muertos. Recargar el portacebos cuando sea necesario.

Alrededor de edificaciones: Colocar el portacebos en zonas no sujetas a inundación. Reemplazar los cebos que hayan sido dañados por el agua o contaminados por la suciedad.

7. PRESENTACIONES

Contenido: 12 bolsas x 1 Kg; cubo de 3 kg (con 3 bolsas de 1 kg)

8. AUTORIZACIONES

Autorización nº ES/BB (MR)-2018-14-00275